

رعایت نکات استاندارد در حمل نمونه های خون و ترشحات داخلی بیمار مشکوک به

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

- ۱- تهیه ۴/۵ سی سی **سرم** خون (۱۰-۷ سی سی خون)
- ۲- تقسیم **سرم** خون در ۳ لوله کوچک در دار مخصوص
- ۳- نصب برچسب مشخصات بر روی هر یک از لوله های بزرگ و کوچک مخصوص (نام و نام خانوادگی، تاریخ تهیه نمونه، نوبت نمونه، نام دانشگاه)
- ۴- قرار دادن ۳ لوله کوچک حاوی **سرم** بیمار و دارای برچسب مشخصات در لوله بزرگ
- ۵- قرار دادن لوله ها در کلد باکس حاوی کیسه یخ
- ۶- ارسال نمونه به همراه فرم بررسی تکمیل شده از بیمارستان به مرکز بهداشت
- ۷- ارسال نمونه به همراه نامه حاوی مشخصات و تصویر فرم خلاصه اطلاعات بیمار توسط مرکز بهداشت شهرستان به انستیتو پاستور ایران

تعداد و تاریخ ارسال نمونه ها :

نمونه اول : بلافاصله پس از تشخیص مورد محتمل

نمونه دوم : ۵ روز پس از نمونه اول

نمونه سوم: ۱۰ روز پس از نمونه اول