

علائم خطر

دوران نوزادی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشتی

* خواب آلودگی غیر عادی یا کاهش هوشیاری

* بی قراری و تحریک پذیری

* تنفس تند (بیشتر از ۶۰ بار در دقیقه)

* درجه حرارت زیر بغلی مساوی یا بالاتر از ۳۷.۵ درجه یا درجه حرارت زیر

بغلی کمتر از ۳۵.۵ درجه

* کاهش قدرت مکیدن

* برآمدگی ملاج

* تشنج

* ناله کردن

* بی حالی

* زردی

والدین گرامی :

یک ماه اول تولد یکی از حساس ترین دوران های زندگی است و کلیه نوزادان باید اولین مراقبت نوزادی را در سه تا پنج روزگی دریافت نمایند . همچنین والدین می بایست به محض مشاهده هر یک از **علائم خطر فوق در نوزاد** ، به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل زندگی خود مراجعه و از وضعیت سلامتی نوزاد خود مطلع شوند .

علائم خطر

دوران کودکی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشتی



* خواب آلودگی غیر عادی یا کاهش هوشیاری

* عدم توانایی نوشیدن یا سخت نوشیدن

* نفس تند (۵۰ و بیشتر در کودک ۲ ماه تا یکسال و ۴۰ و بیشتر در کودک بالای یکسال)

* تشنگی و با و لوع نوشیدن در کودک مبتلا به اسهال

* سفتی گردن و ملاحظ برآمده در کودک تب دار

* حساسیت ، تورم و درد استخوان پشت گوش

* استفراغ مکرر

* خُرخر در کودک آرام

* تو کشیده شدن قفسه سینه

* بی قراری و تحریک پذیری

* فرورفتگی چشم ها

* تب همراه بثورات پوستی

* خروج چرک از گوش

والدین گرامی :

با مشاهده هر یک از علائم خطر فوق ، فوراً به نزدیک ترین مرکز

بهداشتی درمانی محل زندگی خود مراجعه نمایید و از خوددرمانی و

مصرف مواد مخدر برای درمان کودک دلبندتان جداً خودداری

نمایید .