

آیا می دانید در سالهای اخیر چند کودک در استان به علت مسمومیت با متادون فوت کرده اند ؟



آیا می دانید :

مصرف کمتر از یک قاشق چایخوری
شربت متادون در کودکان زیر ۵ سال
می تواند باعث مرگ شود .

متادون یک داروی قوی است که می تواند برای کسانی که آن
را به طور منظم دریافت نمی کنند فوق العاده خطرناک باشد
بنابراین حتی در پایین می تواند برای کودکان کشنده باشد .

علائم مسمومیت با متادون در کودکان :

کاهش سطح هوشیاری ، تنگی نفس ، تهوع ، استفراغ ، نبض
ضعیف ، افت فشار خون ، سفتی و لرزش های عضلانی

اقدامات لازم در مواجهه با کودک مسموم :

- اولین اقدام برای مسمومی که هوشیار است تحریک وی به
استفراغ ، بیدار نگه داشتن و انتقال سریع به نزدیکترین
مرکز درمانی است .
- با توجه به باقی ماندن اثرات متادون بیش از ۵۰ ساعت در
بدن و نیاز به تزریق چندین نوبت دارو (نالوکسان) جهت
رفع مسمومیت ، می بایست کودک حداقل به مدت ۷۲
ساعت در بیمارستان بستری شود .

راههای پیشگیری از مسمومیت با متادون :

- از مصرف متادون در معرض دید کودکان بپرهیزید، چرا که کودکان از رفتار بزرگترها تقلید می کنند و ممکن است دور از چشم والدین ، آن را به دهان ببرند .
- چنانچه در خانه کودک زیر ۵ سال دارید ، حتماً داروها را دور از دسترس کودک ، در کمد های بالا و مجهز به قفل قرار دهید .
- با توجه به طعم شیرین شربت متادون ، آن را در ظروف قفل دار نگهداری کنید و از انتقال آن به ظروف خالی نوشابه ، آب معدنی و سایر بطری های خالی جداً خودداری کنید .
- از نگهداری شربت متادون در یخچال و یا کابینتی که سایر داروها و یا نوشیدنی ها در آن نگهداری می شوند خودداری نمایید .
- به کودکان بیاموزید بدون اجازه بزرگسالان ، هیچ چیزی ننوشند و یا نخورند .

عدم مشاهده علائم و نشانه ها پس از مصرف نابجای دارو دلیل بررفع خطر نمی باشد و لازم است فوراً با اورژانس ۱۱۵، مراکز درمانی و یا شماره ۱۴۹۰ تماس بگیرید .